TONZILARNI PROBLEM
(ILI PROBLEM S TONZILAMA)

dr.sc. Siniša Maslovara, dr.med.
otorinolaringolog i audiolog
Opća županijska bolnica Vukovar

ZAŠTO JE TONZILEKTOMIJA ZNAČAJNA?

- Tonzilektomija je jedan od najį eģĺ ih kirurģkih zahvata u djeį joj dobi uopĺ e.
- Predstavlja najį eģĺ i kirurģki zahvat u otorinolaringologiji.

POVIJEST

- Prvi put učinjena prije više od 2 000 godina (Celsus 30. A.D.)
- Prvu adenoidektomiju je učinio Wilhelm Meyer u Kopenhagenu u 19 st.





TONZILARNI PROBLEM

- KOJA JE FUNKCIJA TONZILA?
- KOJE JE ZNAĻ ENJE TONZILA U OPĹ OJ PATOLOGIJI?
- KAKO IH LIJEĻ ITI? (KAD OPERIRATI?)
- Na odgovore na ova pitanja je godinama utjecalo i joġ uvijek utjeļ e medicinsko znanje odnosno neznanje

ANATOMIJA

Heinrich Wilhelm Gottfried von Waldeyer-Hartz







STAVOVI

- **OPERIRATI SVE ODREDA**
  (Zbog moguĺ ih komplikacija)
- **NE OPERIRATI NIKOGA**
  (Zbog znaļ aja u obrani organizma)
- **AUREA MEDIOCRITAS**

POSTAVLJANJE INDIKACIJE

- Å TU JE NAJVAĢNIJA SURADNJA OTORINOLARINGOLOGA S LIJEĻNIKOM KOJI AMBULANTNO PRATI DIJETE I BILO BI DOBRO DOBITI POPRATNO PISMO, JER SU RODITELJI ĻESTO NEKRITIĻNI I SKLONI JEDNOM OD DVA OPREĻNA STAVA ZBOG LOĠE INFORMIRANOSTI

INDIKACIJE

- **APSOLUTNE**
- Ponavljajuĺ i tonzilitis - 7 upala godiġnje, 5 godiġnje tijekom 2 godine ili 3 godiġnje tijekom 3 godine
- Ponavljajuĺ i peritonzilarni apsces
- Trajni znakovi opstrukcije diġnog puta
- Opstruktivna apneja u spavanju (OSA)
- Sumnja na maligne promjene u tonzilama
- Fokaloze

- **RELATIVNE**
- Kroniļ ni tonzilitis
- Kliconoġtvo BHSGA

  (Kad je on dokazani izvor zaraze u okolini)

DVOJBE

- **DA LI OPERIRATI OSOBE S ATOPIJOM?**
- Prospektivne studije su pokazale da nema pogorġanja ashme ili neke druge atopijske bolesti nakon tonzilektomije
- Neki rezultati ukazuju na smanjen broj napadaja i manjom potrebom za Th.
- ODGOVOR JE **DA**!
- Ipak dobna granica operirane djece se pomiļ e prema ġkolskoj dobi zbog spoznaje o imunoloġkoj vaġnosti tonzila

INDIKACIJE ZA ADENOITOMIJU

- **APSOLUTNE**
- OPSTERUKCIJA DISANJA NA NOS
- Ļ ESTE GNOJNE ILI SEKRETORNE UPALE SREDNJEG UHA (preporuka)

- **RELATIVNE**
- ZATVORENA E. TUBA I PROVODNA NAGLUHOST
- UĻ ESTALI SINUITISI I BRONHITISI
- PROBLEMI U RAZVOJU GOVORA, ZUBA I LICA

KONTRAINDIKACIJE

- **OPĆE**
- AKUTNE RESP. INF.
- HEMORAGIJSKA DIJATEZA
- NEKONTROLIRANI DIJABETES
- LEUKEMIJA
- AGRANULOCITOZA
- AKTIVNA TBC

- **LOKALNE**
- RASCIJEP NEPCA
- KRONIČNA SUHA UPALA ŽDRIJELA

INSTRUMENTI ZA TONZILEKTOMIJU

KOMPLIKACIJE

- **RANE**
  - KRVARENJE
  - BOLOVI U GRIJELU I UHU
  - DEHIDRACIJA
- **KASNE**
  - KRVARENJE

POSTOPERACIJSKI TIJEK

- **OTPUST** NAKON 24h ILI 48h KOD NAS
- MIROVANJE U KUĆI PRVIH 4-5 DANA
- U ŠKOLU, VRTIĆ ILI NA POSAO ZA DVA TJEDNA
- TEKUĆA I KAŠASTA HRANA
- POVIŠENA TJELESNA TEMP. MOŽE BITI OD 37,2°C DO 38,3°C
- BIJELE NASLAGE FIBRINA U LOŽAMA I BOL U UŠIMA SU NORMALNA POJAVA

NOV 22 2006